

食品添加物・殺菌料

バリューラックス®

低食塩 次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液



持ち運び・収納が楽なコンパクトサイズ

食品添加物規格の低食塩次亜塩素酸ナトリウム12%濃度の殺菌剤です。大量使用向けの12%濃度品を4kgと10kgにすることで、食品工場内や機械室への持ち運びが便利になりました。従来の6%濃度品に比べ圧倒的なコストパフォーマンスとハンドリングの良さを併せ持つ、ハイブリット品となります。コスト削減の急先鋒として、バリューラックスを是非お試しください。

製品形態


商品名	容量	梱包入数	JANコード
バリューラックス	4kg	4本入(ノズル付)	4987702616165
	10kg	—	4987702616172

使用方法

600～1200倍希釈 (100mg/L～200mg/L)

食中毒予防

使用例



1. まずは洗浄
2. 溶液に浸漬(10分)
3. 最後に水洗い(10分以上)

生野菜の殺菌 600倍希釈(100mg/L)



トマトやミカンなど

キャベツや
キュウリなど

調理器具の殺菌 300倍希釈(200mg/L)



調理器具など




まな板・フキンなど

300,000～600,000倍希釈

レジオネラ対策

使用例



常時0.2mg/L
～0.4mg/Lくらいに
保ちましょう。

浴槽水の衛生管理



浴槽水

注意！


- 常時 0.2mg/L ～ 0.4mg/L に保ち 1.0mg/L までが望ましい。
(循環式浴槽におけるレジオネラ対策マニュアルより)
- ※ 都道府県又は政令都市により基準値に若干違いがございます。詳細は近くの保健センターへご相談ください。

日常管理の希釈目安

	0.2mg/L	1.0mg/L
1t	約1.7mL	約8.3mL
5t	約8.5mL	約41.5mL

循環ろ過機の維持管理

使用例



週に1度
5mg/L～10mg/Lで
浴槽水を
数時間循環

ろ過水の衛生管理



ろ過水の洗浄


注意！

- 週に1度 5mg/L～10mg/L で浴槽水を数時間循環すること。
循環した後に逆洗浄して汚れを排出すること。
(循環式浴槽におけるレジオネラ対策マニュアルより)

高濃度殺菌希釈目安

	5mg/L	1.0mg/L
1t	約42mL	約84mL
5t	約210mL	約420mL

希釈方法例



予め原液を投入後に水を加えると混ぜる手間が省けます。

● 使用基準 ゴマに使用してはならない

危険

まぜるな危険



金属腐食性物質

急性毒性(低毒性)

水生環境有害性

1. 酸と接触すると有害ガス(塩素ガス)を発生する。
2. 目に入ると失明や視力低下を起こす。
3. 皮膚に付着すると炎症を起こす。
4. 河川等の環境中に投棄すると魚類、貝類に影響する。
5. 子供の手の届かない所に保管する。



混合禁止



目に注意



保護手袋着用



投棄禁止



子供注意

⚠ 使用上の注意

- 必ず使用方法に従って使用すること。
- 本品を誤って飲み込んだ時は、多量の水を飲ませ、速やかに医師の診断を受けること。
- 本品が眼に入った時は、水道水等きれいな水で15分以上洗眼し、速やかに医師の診断を受けること。
- 酸性の製品と本品を絶対に混合しないこと。
- 衣類等に付着すると、漂白力が強いので脱色するので注意すること。
(色、柄物、化学繊維、毛、絹、皮革等)
- 鉄、ブリキ、銅等の金属類に使用すると、錆びるので使用しないこと。
- 高温、直射日光を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- 発赤、腫れ、かゆみ等、皮膚に異常を生じた場合、ただちに使用を中止し医師に相談すること。
- 荒れ性の方が使用する場合、ゴム手袋等着用し使用すること。
- 使用にあたっては、十分換気すること。
- 他の容器に移しかえずに本容器で使用する。誤使用の原因や品質変化の原因になります。
- 開封後は、品質保持のため、早めにご使用ください。

製造販売者



株式会社 カズサ

千葉県千葉市中央区新大塚1-1-1
千葉県承認第 A2065-1 号

〒299-4205 千葉県長生郡白子町南日当 2424-6

商品お問合せ先

TEL 0475-33-6417

<http://www.kazusa1986.co.jp>

取扱店